DOI: 10.13718/j.cnki.xdzk.2025.05.012

贺阳剑, 江长胜, 张文晓, 等. 地膜和生物炭对菜地土壤剖面温室气体的影响 [J]. 西南大学学报(自然科学版), 2025, 47(5): 141-153.

地膜和生物炭对菜地土壤剖面温室气体的影响

贺阳剑, 江长胜, 张文晓, 徐诗文, 李廷勋, 郝庆菊

西南大学 资源环境学院, 重庆 400715

摘要: 菜地是大气温室气体的主要排放来源之一。为探究地膜覆盖(NF: 不覆膜, F: 覆膜)和生物炭施加量(B0: 0 t/hm²; B20: 20 t/hm²; B40: 40 t/hm²)对菜地土壤剖面温室气体的影响, 以西南大学试验农田为研究对象, 采用扩散箱法原位观测了 2020 年辣椒—萝卜轮作菜地 10、20、30 cm 土层的 CO₂、CH₄、N₂O 体积分数。试验共设 6 个处理, 分别为 NFB0、NFB20、NFB40、FB0、FB20、FB40。结果表明: 在整个观测期间, 菜地土壤剖面的 CO₂、CH₄、N₂O 体积分数分别为 653.55~13 059.21、1.10~2.59、0.20~4.76 mL/m³。CO₂ 体积分数随着土壤深度的增加而增加, CH₄ 体积分数随土壤深度的增加而降低, 而 N₂O 随土壤深度变化不大。与 NF 相比, F 使萝卜季土壤剖面的 CO₂ 和 N₂O 体积分数分别提高了 60.62% 和 47.76% ($p < 0.01$), 却使辣椒季和萝卜季土壤剖面的 CH₄ 体积分数分别降低了 7.84% ($p < 0.05$) 和 13.74% ($p < 0.01$)。与 B0 相比, B20 处理下的 CO₂、CH₄ 和 N₂O 体积分数在辣椒季分别提高了 21.08% ($p < 0.01$)、9.24% ($p < 0.05$) 和 37.88% ($p < 0.05$), 在萝卜季分别提高了 80.42%、17.13% 和 77.19% ($p < 0.01$); B40 处理下的 CO₂、CH₄ 和 N₂O 体积分数在辣椒季分别提高了 64.60% ($p < 0.01$)、10.87% ($p < 0.05$) 和 75.76% ($p < 0.05$), 在萝卜季分别提高了 103.63%、8.84% 和 61.40% ($p < 0.01$)。

关键词: 地膜覆盖; 生物炭; 菜地; 温室气体; 土壤剖面

中图分类号: X171 文献标志码: A

文章编号: 1673-9868(2025)05-0141-13

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Effects of Mulching and Biochar on Greenhouse Gas Concentrations in Soil Profiles of Vegetable Field

HE Yangjian, JIANG Changsheng, ZHANG Wenxiao,
XU Shiwen, LI Tingxun, HAO Qingju

College of Resources and Environment, Southwest University, Chongqing 400715, China

Abstract: Vegetable fields are one of the main sources of greenhouse gas emissions to atmosphere. In order

收稿日期: 2024-06-11

基金项目: 国家自然科学基金项目(41275160, 41977186)。

作者简介: 贺阳剑, 硕士研究生, 主要从事农田生态系统碳氮循环研究。

通信作者: 郝庆菊, 副教授, 硕士研究生导师。

to investigate the impact of plastic film mulching (NF: no film mulching, F: film mulching) and biochar application (B0: $0 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, B20: $20 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, B40: $40 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$) on greenhouse gas concentrations in soil profiles of vegetable field, the experimental farmland at Southwest University was used as a research site, and the greenhouse gas concentrations in the 10, 20 and 30 cm soil layers of the pepper-radish rotation vegetable field were observed in situ by the diffusion box method in 2020. In this experiment, a total of six treatments were set up, namely NFB0, NFB20, NFB40, FB0, FB20, FB40. The results showed that during the entire observation period, concentrations of soil profile CO_2 , CH_4 , N_2O in the vegetable field ranged from 653.55 to 13 059.21 $\text{mL} \cdot \text{m}^{-3}$, 1.10 to 2.59 $\text{mL} \cdot \text{m}^{-3}$, and 0.20 to 4.76 $\text{mL} \cdot \text{m}^{-3}$, respectively. CO_2 concentrations increased with soil depth, CH_4 concentrations decreased with soil depth, and N_2O concentrations did not vary much with soil depth. Compared with NF, F increased CO_2 and N_2O concentrations in the radish season by 60.62% and 47.76% ($p < 0.01$), respectively, and decreased CH_4 concentrations in both pepper and radish seasons by 7.84% ($p < 0.05$) and 13.74% ($p < 0.01$), respectively. Additionally, compared to B0, B20 increased CO_2 , CH_4 and N_2O concentrations in the pepper season by 21.08% ($p < 0.01$), 9.24% ($p < 0.05$) and 37.88% ($p < 0.05$), respectively, and in the radish season by 80.42%, 17.13% and 77.19% ($p < 0.01$), respectively, while B40 increased the CO_2 , CH_4 and N_2O concentrations in the pepper season by 64.60% ($p < 0.01$), 10.87% ($p < 0.05$) and 75.76% ($p < 0.05$), respectively, and in the radish season by 103.63%, 8.84%, and 61.40% ($p < 0.01$), respectively.

Key words: plastic film mulching; biochar; vegetable field; greenhouse gas; soil profile

菜地由于复种指数高、施肥量大、灌溉频繁^[1],是大气 CO_2 、 CH_4 、 N_2O 等温室气体重要排放来源之一。我国作为目前世界上最大的蔬菜生产国,蔬菜种植面积 2 198.6 万 hm^2 ,占全国农作物总播种面积的 13.03%^[2]。据估算,我国 1 hm^2 菜地一年的温室气体排放量约为 6 244 kg 二氧化碳当量,排放总量为 13 728.06 万 t 二氧化碳当量,菜地温室气体排放量已经超过了我国谷物作物系统温室气体的排放量^[3]。因此,在全球气候变暖的背景下,如何实现菜地在蔬菜增产的同时减少温室气体排放对于农业绿色发展具有重要意义。

菜地温室气体排放受这些气体在土壤剖面产生、消耗和传输作用的影响,并受环境和管理因素的调控。Button 等^[4]通过不同土层间的 CO_2 浓度梯度计算得来的小麦田理论排放通量仅与实际值相差 6%;冯迪等^[5]发现,菜地 N_2O 排放通量与土壤 N_2O 含量呈显著的正相关关系;张凯莉等^[6]发现,菜地地表 CH_4 浓度与 10 cm、20 cm 土层的 CH_4 含量之间存在显著的正相关关系。通过观测菜地土壤剖面的温室气体含量,可以深入理解温室气体在土壤剖面的分布特征,有助于菜地温室气体减排研究。

地膜覆盖作为一种常用的农田管理措施,可以有效改善土壤水热状况及理化性质,影响土壤微生物群落的分布^[7],增加粮食产量^[8-9]。有研究发现,覆膜会影响土壤温室气体的产生,在辣椒—萝卜轮作菜地,覆膜显著提高了观测期间的土壤 CO_2 含量以及萝卜季的 N_2O 含量,但显著降低了萝卜季土壤剖面的 CH_4 含量^[10]。生物炭 C/N 高,比表面积大,孔隙发达,表面官能团丰富,稳定性好,可以改善退化和低肥力的土壤^[11],提高作物产量^[12]。研究发现,生物炭施加也会影响土壤温室气体的产生,在小麦—水稻轮作农田,施氮条件下配施生物炭降低了水稻季土壤上层剖面的 CH_4 含量,以及小麦季土壤剖面各层次和水稻季土壤上层剖面的 N_2O 含量^[13]。目前,关于地膜覆盖和生物炭施加对菜地土壤剖面温室气体含量的影响研究还鲜见报道。基于此,本研究以西南地区典型的辣椒—萝卜轮作菜地为研究对象,探究地膜覆盖、生物炭施加及两者的交互作用对菜地土壤剖面温室气体体积分数的影响,以期为西南地区菜地温室气体减排提供参考。

1 材料与方 法

1.1 试验区概况

试验菜地位于西南大学实验农场($30^{\circ}26' \text{ N}$, $106^{\circ}26' \text{ E}$),海拔 230 m,属于典型的亚热带湿润季风

气候。试验期间(2020年5月—2020年12月)的气温和降水量如图1所示。试验区整体上雨热同期,气温、降水量具有明显的季节变化规律,辣椒季的气温和降水量高于萝卜季。辣椒季的平均气温为 26.90°C ,累积降水量为 718.06 mm ;萝卜季的平均气温为 15.35°C ,累积降水量为 224.79 mm 。试验菜地土壤为中生代侏罗系沙溪庙组灰棕紫色沙泥岩母质上发育的中性紫色土,土壤表层(0~20 cm)的理化性质为:土壤pH值6.83、有机质 25.29 g/kg 、总磷 646.00 mg/kg 、有效磷 5.94 mg/kg 、总钾 9.44 g/kg 、有效钾 102.47 mg/kg 、全氮 1.35 g/kg 、碱解氮 56.62 mg/kg 。

图1 试验期间的日平均气温和降水量

1.2 试验设计与方法

试验种植模式为西南地区常见的辣椒—萝卜轮作,辣椒品种为‘龙椒一号’,购于重庆龙胜种子经营部,萝卜品种为‘长白玉’,购于绵阳市涪城区龙门镇农资批发市场。本试验采用的生物炭由玉米秸秆制成,购于南京三聚生物质新材料科技有限公司,其基本理化性质为:比表面积 $224.25\text{ m}^2/\text{g}$ 、有机碳 537.97 g/kg 、总磷 2.00 g/kg 、总钾 27.15 g/kg 、全氮 0.61 g/kg 。生物炭于试验开始前一次性施入,之后不再添加。试验开始前,先将土地深翻,使土地尽可能平整,然后平地起垄,垄长 2.8 m ,垄宽 0.8 m ,垄高 0.15 m ,垄间距 0.4 m 。地膜选用 0.005 mm 厚的聚乙烯透明塑料薄膜平整覆于垄上,两边用细土压实。试验在不覆膜(NF)和覆膜(F)处理下各设置了3种不同的生物炭施加水平(B0: 0 t/hm^2 ; B20: 20 t/hm^2 ; B40: 40 t/hm^2),共6个处理,分别为NFB0、NFB20、NFB40、FB0、FB20、FB40。每个处理3个重复,共18个小区。

因不可抗因素,辣椒错过最佳播种时间,于2020年5月27日移栽辣椒苗,6月21日追肥,之后辣椒成熟分批收获,并于9月2日收获最后一批。萝卜籽播种于2020年9月24日,10月23日追肥,12月24日萝卜成熟后一次性收获。所有小区在辣椒季和萝卜季的施肥量相同,氮肥(尿素)、钾肥(氯化钾)、磷肥(过磷酸钾)施加量分别为 300 、 100 、 150 kg/hm^2 ,磷肥和钾肥作为基肥在播种或移栽前一次性施加,氮肥在基肥和追肥时各施加一半。试验期间田间管理方式与当地种植习惯相同,蔬菜种植期间无人工灌溉。

1.3 气体样品采集与测定

采用扩散箱法采集不同处理下菜地土壤剖面的温室气体。扩散箱由集气管、导气管、橡胶塞、三通阀4个部分组成。集气管是一根圆柱形的PVC管(直径 5 cm ,容积 1000 cm^3),管壁一侧钻有孔洞(4排,每排25个,直径 3 mm),管端两侧用橡胶塞密封,确保集气管只能通过孔洞交换气体;导气管是一根内径为 1 mm 的聚乙烯塑料管,其一端穿过橡胶塞伸到集气管中央,另一端垂直伸出地表并在末端配有三通阀,非采集时间三通阀保持关闭状态,防止集气管内气体通过导气管泄露。试验开始前,将扩散箱洞口向下水平埋在 10 、 20 、 30 cm 土深处,确保集气管中心轴距垄上表面的距离即为预埋深度,以减小试验误差。

试验观测期间,每月选择一晴朗天气在上午的 9:00—11:00 进行气体样品的采集。研究表明,这个时期的土壤温室气体通量能够代表一天的平均值,因为这个时期的土壤温度接近土壤温度的日均值^[14]。由于土壤温室气体通量受温室气体在土壤剖面产生、消耗和传输作用的影响,本研究土壤温室气体体积分数的观测也选在这一时间段内进行。采样时,用 60 mL 注射器从扩散箱采集不同剖面的气体,采集气样后关闭三通阀,并在 24 h 内将气样送至实验室使用安捷伦气相色谱仪(Agilent 7890A)测定 CO₂、CH₄、N₂O 体积分数。CO₂ 和 CH₄ 体积分数使用氢火焰离子检测器(FID)测定, N₂O 体积分数使用电子捕获检测器(ECD)测定,具体分析方法及工作条件参照文献[15]。

1.4 土壤环境因子的测定方法

每月采集一次垄上土壤样品,采样深度为 0~20 cm。采样时,使用“四分法”将每个采样点采集的 5 份样品均匀混合为 1 个土样,剔除土样中的杂物,装入自封袋。一部分进行风干处理,另一部分放入 4 °C 冰箱内保存。土壤有机碳(SOC)采用重铬酸钾氧化—外加热法测定,全氮(TN)采用凯氏定氮法测定,可溶性有机碳(DOC)采用 Multi N/C 2100 分析仪测定,硝态氮(NO₃⁻-N)和铵态氮(NH₄⁺-N)经 2M KCl 溶液浸提后用流动注射分析仪(FIAstar 5000, 德国)测定。土壤样品在 105 °C 的烘箱中干燥 48 h 后计算土壤质量含水率。在每次采集土样的同时,使用 JM624 型便携式温度计测量土壤地下 5 cm 温度。

1.5 数据处理

采用 IBM SPSS Statistics 26 进行方差分析。同一生长季,不同处理下不同土层间温室气体体积分数的差异显著性采用三因素方差分析;同一生长季,不同处理下各环境因子的差异显著性采用双因素方差分析。 $p < 0.05$ 视为差异性显著。

2 结果与分析

2.1 土壤环境因子

2.1.1 土壤地下 5 cm 温度和质量含水率

观测期间不同处理下的地下 5 cm 温度及土壤质量含水率如表 1 所示,地下 5 cm 温度表现为辣椒季高于萝卜季,这与气温的季节分布一致,土壤质量含水率则表现为辣椒季低于萝卜季。无论是在辣椒季,还是在萝卜季,地膜覆盖、生物炭施加及两者的交互作用对地下 5 cm 温度和土壤质量含水率均无显著影响($p > 0.05$)。

表 1 不同生长季的土壤温度及含水率

处理	辣椒季		萝卜季	
	地下 5 cm 温度/°C	土壤质量含水率/%	地下 5 cm 温度/°C	土壤质量含水率/%
NFB0	24.95±0.76	15.47±3.24	14.97±1.45	15.70±1.75
NFB20	24.65±0.79	14.28±3.28	15.16±1.50	16.08±1.59
NFB40	23.92±0.76	15.81±4.05	14.18±1.34	21.40±1.78
FB0	27.55±1.26	14.61±2.41	15.19±1.49	18.36±2.20
FB20	25.80±1.09	14.40±2.20	13.86±1.32	17.13±2.85
FB40	25.18±1.12	14.57±1.80	14.11±1.54	17.33±2.29

方差分析结果

F	ns	ns	ns	ns
B	ns	ns	ns	ns
F×B	ns	ns	ns	ns

注:① F 代表覆膜, B 代表生物炭施加;② ns 表示差异不显著,下同。

2.1.2 土壤氮质量分数

观测期间不同处理下的土壤 NH_4^+ -N、 NO_3^- -N 及 TN 质量分数如表 2 所示。在辣椒季, 无论是 NH_4^+ -N, 还是 NO_3^- -N, 其不同处理下的变化规律均表现为: $\text{NFB0} < \text{FB0}$, $\text{NFB20} < \text{FB20}$, $\text{NFB40} < \text{FB40}$ 。覆膜显著提高了 NH_4^+ -N ($p < 0.05$) 和 NO_3^- -N ($p < 0.01$) 质量分数, 但生物炭施加及其与覆膜交互作用的影响则不显著 ($p > 0.05$)。不同处理下的 TN 质量分数表现为: $\text{NFB0} < \text{NFB40} < \text{NFB20}$, $\text{FB0} < \text{FB20} < \text{FB40}$ 。无论覆膜与否, 生物炭施加均显著提高了 TN 质量分数 ($p < 0.05$), 但覆膜及其与生物炭施加交互作用的影响不显著 ($p > 0.05$)。在萝卜季, 覆膜、生物炭施加及两者的交互作用对 NH_4^+ -N、 NO_3^- -N 以及 TN 质量分数均无显著影响 ($p > 0.05$)。

表 2 不同生长季的土壤 NH_4^+ -N、 NO_3^- -N 及 TN 质量分数

处理	辣椒季			萝卜季		
	NH_4^+ -N/ ($\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)	NO_3^- -N/ ($\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)	TN/ ($\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$)	NH_4^+ -N/ ($\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)	NO_3^- -N/ ($\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)	TN/ ($\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$)
NFB0	55.64±22.06	16.50±5.04	0.58±0.06	24.76±6.32	14.76±8.91	0.66±0.11
NFB20	62.54±28.71	15.74±5.11	0.93±0.20	23.41±6.50	19.55±9.31	0.80±0.19
NFB40	58.27±23.91	11.87±4.18	0.74±0.09	25.89±10.84	71.56±57.96	0.72±0.11
FB0	61.62±6.80	39.18±14.37	0.56±0.05	49.38±24.56	122.65±54.21	0.69±0.01
FB20	166.14±62.14	97.16±27.48	0.78±0.05	26.25±5.38	95.61±34.60	0.74±0.05
FB40	137.38±49.99	55.56±11.07	0.95±0.18	24.29±13.17	30.03±22.24	0.68±0.07
方差分析结果						
F	*	**	ns	ns	ns	ns
B	ns	ns	*	ns	ns	ns
F×B	ns	ns	ns	ns	ns	ns

注: * 表示在 0.05 水平上差异显著, ** 表示在 0.01 水平上差异显著, 下同。

2.1.3 土壤碳质量分数

表 3 显示了不同处理下土壤 SOC 和 DOC 质量分数。不论是在辣椒季, 还是在萝卜季, 不同处理下的 SOC 和 DOC 质量分数均表现为: $\text{NFB0} < \text{NFB20} < \text{NFB40}$, $\text{FB0} < \text{FB20} < \text{FB40}$ 。无论覆膜与否, 随着生物炭施入量的增加, 土壤 SOC 质量分数 ($p < 0.01$) 和 DOC 质量分数 ($p < 0.05$) 均显著增加。然而覆膜及其与生物炭施加的交互作用对 SOC 和 DOC 质量分数却均无显著影响 ($p > 0.05$)。

表 3 不同生长季的土壤 SOC 和 DOC 质量分数

处理	辣椒季		萝卜季	
	SOC/($\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$)	DOC/($\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)	SOC/($\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$)	DOC/($\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)
NFB0	10.10±0.38	21.08±1.32	10.08±0.44	20.38±1.15
NFB20	12.63±0.87	25.37±1.70	12.19±1.40	21.58±1.62
NFB40	14.05±1.02	25.45±1.12	14.22±2.62	23.72±0.88
FB0	10.02±0.23	19.26±1.02	9.50±0.46	19.13±1.02
FB20	12.33±0.85	22.74±1.67	11.71±0.32	20.39±1.40
FB40	13.05±0.82	25.32±1.77	15.65±4.04	23.98±1.53
方差分析结果				
F	ns	ns	ns	ns
B	**	**	**	*
F×B	ns	ns	ns	ns

2.2 土壤剖面 CO₂ 体积分数

在不同处理下, 10、20、30 cm 土层的 CO₂ 体积分数具有相似的季节变化规律, 整个观测期间的 CO₂ 体积分数为 653.55~13 059.21 mL/m³ (图 2)。辣椒季, CO₂ 体积分数先升高后降低, 峰值大多出现在 6 月中旬。萝卜季, CO₂ 体积分数也呈先升高后降低趋势, 峰值均出现在 11 月中旬。

图 2 不同处理下土壤 CO₂ 体积分数的季节变化

表 4 显示了不同处理下菜地土壤剖面的 CO₂ 体积分数。在萝卜季, 相比于 NF, F 显著提高了 CO₂ 体积分数 ($p < 0.01$), 增幅为 60.62%, 而辣椒季覆膜的影响则不显著 ($p > 0.05$)。不同生物炭施加量下的 CO₂ 体积分数在辣椒季和萝卜季均表现为: B0 < B20 < B40。其中, 相比于 B0 处理, B20 和 B40 处理在辣椒季使 CO₂ 增加了 21.08% 和 64.60%, 在萝卜季增加了 80.42% 和 103.63%。施加生物炭显著提高了辣椒季和萝卜季的 CO₂ 体积分数 ($p < 0.01$)。无论是辣椒季还是萝卜季, 土壤剖面 CO₂ 均随土壤深度的增加而显著增加 ($p < 0.01$)。相比于 10 cm 土层, 20 cm 和 30 cm 土层的 CO₂ 在辣椒季分别增加了 72.50% 和 60.19%, 在萝卜季分别增加了 63.72% 和 58.35%。另外, 三因素方差分析结果表明, 除覆膜与生物炭施加、覆膜与土壤深度的交互作用对萝卜季的 CO₂ 有显著影响 ($p < 0.01$) 外, 覆膜、生物炭施加以及土壤深度的交互作用对整个观测季的 CO₂ 均无显著影响 ($p > 0.05$)。

表 4 不同生长季的土壤 CO₂ 体积分数mL · m⁻³

处理	辣椒季			萝卜季		
	10 cm	20 cm	30 cm	10 cm	20 cm	30 cm
NFB0	2 421.34±701.58	4 975.83±564.64	3 503.71±787.12	1 194.68±138.34	2 262.31±295.21	2 366.36±171.09
NFB20	2 854.96±348.67	4 471.23±611.06	5 034.76±319.69	1 000.28±113.65	2 195.01±293.30	3 826.54±632.03
NFB40	3 234.37±201.35	6 075.65±639.51	7 469.46±558.78	1 329.51±192.22	2 893.83±239.34	3 356.26±703.46
FB0	2 733.66±408.88	3 621.33±810.48	3 823.87±781.22	1 672.38±255.79	2 193.64±470.29	1 307.43±198.19
FB20	2 936.01±102.43	4 976.52±601.76	5 249.87±701.56	2 963.66±108.18	5 289.39±759.33	4 565.89±582.58
FB40	4 609.54±480.98	8 291.06±894.11	5 017.88±290.50	4 451.14±532.11	5 814.01±914.92	4 547.97±506.60
方差分析结果						
F		ns			**	
B		**			**	
D		**			**	
F×B		ns			**	
F×D		ns			**	
B×D		ns			ns	
F×B×D		ns			ns	

注: D 代表土壤深度, 下同。

2.3 土壤剖面 CH₄ 体积分数

覆膜与生物炭施加均没有改变土壤 CH₄ 体积分数随季节的变化趋势(图 3), 整个观测期间的 CH₄ 体积分数为 1.10~2.59 mL/m³。辣椒季, 各土层 CH₄ 体积分数随着时间推移波动变化, 大致在 6 月中旬和 9 月上旬出现两个峰值; 萝卜季, 各土层的 CH₄ 体积分数随着时间推移呈轻微上升趋势。

表 5 显示了不同处理下菜地土壤剖面的 CH₄ 体积分数。无论是辣椒季还是萝卜季, 覆膜、生物炭施加、土壤深度均对 CH₄ 体积分数产生了显著影响。相比于 NF, F 显著降低了辣椒季($p < 0.05$)和萝卜季($p < 0.01$)的 CH₄ 体积分数, 降幅分别为 7.84%和 13.74%; 相比于 B0, 生物炭施加显著提高了整个观测期间的 CH₄ 体积分数, B20、B40 处理下的 CH₄ 体积分数在辣椒季分别提高了 9.24%和 10.87%($p < 0.05$), 在萝卜季分别提高了 17.13%和 8.84%($p < 0.01$); 无论是辣椒季还是萝卜季, 不同土层间的 CH₄ 体积分数从小到大均为: 30 cm(1.90 mL/m³ 和 1.79 mL/m³)、20 cm(1.92 mL/m³ 和 2.00 mL/m³)、10 cm(2.07 mL/m³ 和 2.11 mL/m³)。随着土壤深度的增加, 辣椒季($p < 0.05$)和萝卜季($p < 0.01$)的 CH₄ 体积分数均显著降低。另外, 三因素方差分析结果表明, 除覆膜与生物炭施加的交互作用对萝卜季的 CH₄ 有显著影响($p < 0.05$)外, 覆膜、生物炭施加以及土壤深度的交互作用对整个观测季的 CH₄ 均无显著影响($p > 0.05$)。

表 5 不同生长季的菜地 CH₄ 体积分数mL · m⁻³

处理	辣椒季			萝卜季		
	10 cm	20 cm	30 cm	10 cm	20 cm	30 cm
NFB0	2.08±0.12	2.05±0.15	1.80±0.21	2.11±0.13	2.18±0.10	1.81±0.11
NFB20	2.21±0.08	2.06±0.08	2.03±0.12	2.42±0.10	2.27±0.09	2.14±0.08
NFB40	2.21±0.08	1.97±0.12	1.93±0.16	2.32±0.12	2.05±0.04	1.70±0.16
FB0	1.77±0.14	1.62±0.16	1.69±0.16	1.75±0.06	1.59±0.08	1.42±0.15
FB20	2.03±0.12	1.90±0.10	1.80±0.10	2.09±0.10	1.99±0.06	1.82±0.11
FB40	2.12±0.07	1.90±0.10	2.12±0.13	1.97±0.11	1.93±0.14	1.84±0.08
方差分析结果						
F		*			**	
B		*			**	
D		*			**	
F×B		ns			*	
F×D		ns			ns	
B×D		ns			ns	
F×B×D		ns			ns

图 3 不同处理下土壤 CH₄ 体积分数的季节变化

2.4 土壤剖面 N₂O 体积分数

在不同处理下, 10、20、30 cm 土层的 N₂O 体积分数具有相似的季节变化规律, 整个观测期间的 N₂O 体积分数为 0.20~4.76 mL/m³(图 4)。辣椒季, N₂O 体积分数先升高后降低, 峰值均出现在 6 月中旬; 萝卜季, N₂O 体积分数总体变化平稳, 无太大波动。

表 6 显示了不同处理下菜地土壤剖面的 N₂O 体积分数。在萝卜季, 相比于 NF, F 显著提高了 N₂O 体积分数($p < 0.01$), 增幅为 47.76%, 而辣椒季覆膜的影响不显著($p > 0.05$)。无论是辣椒季还是萝卜季, B20 和 B40 处理下的 N₂O 体积分数相比于 B0 处理均显著提高。其中, B20 和 B40 处理在辣椒季使 N₂O 体积分数增加了 37.88% 和 75.76% ($p < 0.05$), 在萝卜季增加了 77.19% 和 61.40% ($p < 0.01$)。不同于 CO₂ 和 CH₄, 整个观测期间 N₂O 体积分数随土壤深度增加而不显著地增加($p > 0.05$)。三因素方差分析结果还表明, 除覆膜与生物炭施加、覆膜与土壤深度的交互作用对萝卜季的 N₂O 影响极显著($p < 0.01$)外, 覆膜、生物炭施加以及土壤深度的交互作用对 N₂O 均无显著影响($p > 0.05$)。

图 4 不同处理下土壤 N₂O 体积分数的季节变化

表 6 不同生长季的土壤 N₂O 体积分数

mL · m⁻³

处理	辣椒季			萝卜季		
	10 cm	20 cm	30 cm	10 cm	20 cm	30 cm
NFB0	0.58±0.12	0.89±0.30	0.66±0.12	0.45±0.08	0.61±0.11	0.85±0.30
NFB20	1.01±0.49	1.06±0.49	0.95±0.33	0.39±0.03	0.62±0.10	1.08±0.28
NFB40	0.83±0.30	1.44±0.61	1.53±0.82	0.55±0.09	0.71±0.29	0.81±0.26
FB0	0.56±0.09	0.61±0.09	0.65±0.14	0.51±0.04	0.62±0.11	0.38±0.03
FB20	0.62±0.18	0.84±0.21	0.97±0.23	1.08±0.26	1.60±0.25	1.28±0.33
FB40	1.08±0.37	1.19±0.34	0.85±0.24	1.18±0.14	1.32±0.25	0.95±0.22

方差分析结果

F	ns	**
B	*	**
D	ns	ns
F×B	ns	**
F×D	ns	**
B×D	ns	ns
F×B×D	ns	ns

3 讨论与结论

3.1 讨论

3.1.1 地膜覆盖和生物炭施加对土壤剖面 CO₂ 的影响

本研究发现,无论是在辣椒季还是在萝卜季,所有处理均表现为 CO₂ 体积分数随土壤深度增加而增加(表 4)。这主要是因为,虽然表层土壤有机质含量丰富,有利于 CO₂ 的生成,但丰富的有机质改变了土壤结构,增加了土壤的渗透性^[16],使得表层土壤的 CO₂ 更易于向大气扩散。而深层土壤结构更加紧密,气体有效扩散系数相对较低^[4],CO₂ 向周边土层的扩散受到限制。有田间试验发现,在华北平原冬小麦—夏玉米农田,土壤 CO₂ 含量随深度的增加而增加^[17],与本研究结果相似。

在萝卜季,覆膜提高了土壤 CO₂ 体积分数(表 4),这可能是由于地膜覆盖可以物理阻隔 CO₂ 向大气扩散。但在辣椒季,覆膜对土壤 CO₂ 却无显著影响(表 4),与萝卜季的结果不一致。Nishimura 等^[18]研究发现,一方面土壤温室气体可以从覆膜的垄间向相邻未覆膜的沟水平扩散,另一方面随着环境温度增加,从地膜垂直渗出的温室气体量呈指数增加。在本试验中,辣椒种植于夏秋季,天气炎热,各处理下的土壤平均温度为 25.34 °C,远高于萝卜季的 14.58 °C(表 1),这使得辣椒季的 CO₂ 水平扩散速率以及垂直渗出速率要大大高于萝卜季,可能就是这种温度差异导致辣椒季和萝卜季在研究结果上存在差异。

在辣椒季和萝卜季,生物炭施加均显著提高了土壤 CO₂ 体积分数(表 4)。这可能主要是有以下几个原因:第一,生物炭促进了作物生长,增强了作物吸收大气 CO₂ 的能力,使植物根系向土壤中释放的碳增多^[19]。本研究发现,在辣椒季和萝卜季,生物炭施加提高了 SOC 质量分数(表 3)。第二,有研究发现,当土壤施加生物炭后,会促使其中的不稳定碳释放出来^[20],本研究的试验结果也表明,在辣椒季和萝卜季,生物炭施加提高了 DOC 质量分数(表 3)。SOC 和 DOC 为微生物生长、繁殖提供了碳源,促进了土壤呼吸。第三,生物炭的多孔结构及其表面官能团的存在使得生物炭可以吸附土壤中的 CO₂^[21-22],防止 CO₂ 向大气扩散。第四,Kuzyakov 等^[23]研究发现,新鲜生物炭虽然主要由芳香族化合物组成,但也含有一定量的多糖及脂质,使得生物炭本身可作为碳源而被缓慢地分解,有利于 CO₂ 的生成。

3.1.2 地膜覆盖和生物炭施加对土壤剖面 CH₄ 的影响

与 CO₂ 相反,CH₄ 体积分数随土壤深度的增加而降低(表 5),这说明菜地是大气 CH₄ 的吸收汇^[24]。当菜地表层吸收大气 CH₄ 后,向下扩散,由于底层土壤越来越紧实,从而导致底层 CH₄ 体积分数低于表层。Chen 等^[10]通过田间试验也发现了与本研究相似的试验现象,即较深土壤中的 CH₄ 体积分数显著低于表层土壤。然而,杨波等^[25]通过在稻麦轮作农田开展田间试验发现,小麦生长季的 CH₄ 体积分数随着土壤深度增加而增加,与本研究结论不一致。这可能是因为小麦季之前是水稻季,由于水稻季往复淹水,阻止了大气—土壤界面间 O₂ 的交换,导致农田土壤可能形成产 CH₄ 所需的厌氧环境。到了小麦季,虽然大气中的 O₂ 可以进入表层土壤,但由于土壤底层气体有效扩散系数相对较低^[4],导致底层土壤可能仍是厌氧环境,有利于 CH₄ 产生。

本研究发现,覆膜显著降低了土壤 CH₄ 体积分数(表 5)。有田间试验发现,在黄土高原玉米农田,覆膜显著降低了土壤不同深度处的 CH₄ 体积分数^[26],与本研究结论相似。一方面,地膜覆盖的阻隔作用限制了大气中的 CH₄ 进入土壤;另一方面,地膜覆盖有效阻止了雨水对菜地的直接冲刷作用,提高了蔬菜地 NH₄⁺-N 和 NO₃⁻-N 质量分数(表 2),可能造成了以下 3 个影响:第一,NH₄⁺-N 质量分数的增加可以促进 CH₄ 氧化^[27],进而降低土壤 CH₄ 浓度;第二,NO₃⁻-N 为反硝化过程提供了底物,有利于反硝化细菌增加,这可能会与产甲烷菌形成微生物竞争^[28];第三,覆膜阻止了 O₂ 在土壤—大气界面中的交换,使得菜地土壤可能形成局部厌氧环境。在厌氧环境下,甲烷氧化菌利用 NO₃⁻-N 作为电子供体,发生反硝化型甲烷厌氧氧化反应^[29]。

本研究还发现, 生物炭的施加显著提高了土壤 CH_4 体积分数(表 5)。这可能主要是由以下几个原因所致。首先, 生物炭孔隙率高, 施加土壤后可以增加土壤的通气性, 降低土壤的堆积密度^[30], 有利于大气 CH_4 进入土壤, 且生物炭可以吸附土壤中的 CH_4 , 防止 CH_4 从土壤中逸出。其次, 生物炭施入土壤后有利于大团聚体的形成^[31]。由于大团聚体内的孔隙大小不一, 部分孔隙在大团聚体形成过程中被封闭, 外部空气与大团聚体的交流受到孔隙网络的限制, 缺氧成为团聚体最显著的环境特征, 这抑制了大团聚体内甲烷氧化菌的活性^[32], 从而削弱了 CH_4 的氧化作用。最后, 生物炭施加提高了菜地 SOC 和 DOC 的质量分数(表 3), 在厌氧或者局部厌氧环境下有利于 CH_4 的产生。

3.1.3 地膜覆盖和生物炭施加对土壤剖面 N_2O 的影响

与 CO_2 相似, N_2O 体积分数随土壤深度的增加而增加(表 6)。贾俊香等^[33]通过田间大棚试验发现, 菜地土壤剖面的 N_2O 体积分数呈现 $50\text{ cm} > 30\text{ cm} > 15\text{ cm} > 7\text{ cm}$ 的梯度特征, 与本研究结论相似。造成这种现象的主要原因是: 一方面, 与表层相比, 底层土壤更加紧密^[4], 这阻止了底层 N_2O 向周边土层扩散, 使得 N_2O 易于在底层积累。另一方面, 硝化作用是菜地 N_2O 产生的主要来源, 土壤 N_2O 体积分数与土壤含水率呈显著正相关^[34]。杜康等^[35]通过研究发现, 在 $0\sim 50\text{ cm}$ 土层, 农田土壤含水量随着深度的增加而增加, 与 N_2O 体积分数的分布趋势一致。

覆膜显著提高了萝卜季的 N_2O 体积分数, 而对辣椒季的 N_2O 体积分数无显著影响(表 6), 这与覆膜对土壤 CO_2 的影响一致(表 4)。不同于菜地土壤吸附大气 CH_4 , N_2O 同 CO_2 一样, 都表现为从土壤向大气扩散的特征。因此, 覆膜对萝卜季和辣椒季 N_2O 体积分数的影响不一致, 也如前文在 CO_2 部分阐释的原因相同, 即: 一方面, 覆膜有效阻止了土壤 N_2O 向大气扩散。另一方面, 萝卜季和辣椒季土壤温度的差异导致 N_2O 水平扩散量及垂直渗出量存在差异。

本研究发现, 无论辣椒季还是萝卜季, 生物炭施加均提高了土壤 N_2O 体积分数(表 6)。王晓辉等^[36]于温室中研究发现, 当生物炭施入菜地土壤后, 首先提高了土壤 pH 值, 增加了氨氧化古菌和氨氧化细菌群落的丰度, 增强了土壤的硝化潜势。且本研究中生物炭施加增加了菜地 SOC 和 DOC 的质量分数(表 3), 为氨氧化古菌、氨氧化细菌和反硝化细菌生长、繁殖提供了所需的碳源, 也为硝化过程提供了足够多的电子供体, 从而促使更多的铵态氮和硝态氮转为 N_2O 。其次, 生物炭施入提高了 nirK 型反硝化细菌的基因丰度^[36], 有利于反硝化过程中 N_2O 的积累。最后, 同 CO_2 和 CH_4 一样, 生物炭的多孔结构有利于吸附土壤剖面产生的 N_2O , 防止产生的 N_2O 从土壤中逸出。然而, 马芸芸等^[37]发现, 秸秆生物炭施入水稻田后降低了剖面 N_2O 体积分数, 与本研究结论不一致。这可能是由于水稻田长期处于淹水环境而导致土壤缺氧, 从而有利于反硝化反应。有研究发现, 在较好的反硝化条件下, 生物炭施入使得 $\text{N}_2\text{O}/(\text{N}_2\text{O} + \text{N}_2)$ 比值持续降低, 促使更多的 N_2O 还原为 N_2 ^[38]。

3.2 结论

(1) 土壤剖面的 CO_2 体积分数随土壤深度的增加而增加; 覆膜提高了萝卜季土壤 CO_2 体积分数, 但对辣椒季土壤 CO_2 体积分数无显著影响; 施加生物炭提高了整个观测期间的土壤 CO_2 体积分数。

(2) 土壤剖面的 CH_4 体积分数随土壤深度的增加而降低; 覆膜降低了土壤 CH_4 体积分数, 而施加生物炭则提高了土壤 CH_4 体积分数。

(3) 土壤剖面的 N_2O 体积分数随土壤深度变化不大; 覆膜提高了萝卜季土壤 N_2O 体积分数, 但对辣椒季土壤 N_2O 体积分数无显著影响; 施加生物炭提高了整个观测期间的土壤 N_2O 体积分数。

参考文献:

- [1] YAN H L, XIE L Y, GUO L P, et al. Characteristics of Nitrous Oxide Emissions and the Affecting Factors from Vegetable Fields on the North China Plain [J]. Journal of Environmental Management, 2014, 144: 316-321.

- [2] 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴 2022 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2022.
- [3] ZHANG F, LIU F B, MA X, et al. Greenhouse Gas Emissions from Vegetables Production in China [J]. *Journal of Cleaner Production*, 2021, 317: 128449.
- [4] BUTTON E S, MARSHALL M, SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ A R, et al. Greenhouse Gas Production, Diffusion and Consumption in a Soil Profile under Maize and Wheat Production [J]. *Geoderma*, 2023, 430: 116310.
- [5] 冯迪, 郝庆菊, 张凯莉, 等. 地膜覆盖对菜地生态系统 N_2O 排放的影响 [J]. *环境科学*, 2017, 38(10): 4380-4389.
- [6] 张凯莉, 郝庆菊, 冯迪, 等. 地膜覆盖对蔬菜地甲烷排放的影响 [J]. *环境科学*, 2017, 38(8): 3451-3462.
- [7] LI N Y, QU J H, YANG J Y. Microplastics Distribution and Microbial Community Characteristics of Farmland Soil under Different Mulch Methods [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2023, 445: 130408.
- [8] 郭怡婷, 罗晓琦, 王锐, 等. 生物可降解地膜覆盖对关中地区小麦-玉米农田温室气体排放的影响 [J]. *环境科学*, 2022, 43(5): 2788-2801.
- [9] 宋稳锋, 王志远, 吴心瑶, 等. 不同保水剂及覆盖材料对西南旱作农田土壤特性和油菜生长的影响 [J]. *西南大学学报(自然科学版)*, 2023, 45(3): 88-99.
- [10] CHEN J, JIANG C, TU T, et al. Changes in Soil Greenhouse Gas Concentrations Induced by Plastic Film Mulching in a Hot Pepper-Radish Rotation [J]. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 2023, 20(10): 11523-11536.
- [11] EL-NAGGAR A, LEE S S, RINKLEBE J, et al. Biochar Application to Low Fertility Soils: A Review of Current Status, and Future Prospects [J]. *Geoderma*, 2019, 337: 536-554.
- [12] QIU L L, LI D D, LI Z Q, et al. Biochar-Induced Variations in Crop Yield Are Closely Associated with the Abundance and Diversity of Keystone Species [J]. *Science of The Total Environment*, 2022, 827: 154340.
- [13] 周自强, 李露, 张恒, 等. 氮肥配施小麦秸秆生物炭对稻麦轮作土壤剖面 CH_4 和 N_2O 浓度的影响 [J]. *南京农业大学学报*, 2015, 38(3): 431-438.
- [14] YAO Z S, ZHENG X H, XIE B H, et al. Comparison of Manual and Automated Chambers for Field Measurements of N_2O , CH_4 , CO_2 Fluxes from Cultivated Land [J]. *Atmospheric Environment*, 2009, 43(11): 1888-1896.
- [15] WANG Y S, WANG Y H. Quick Measurement of CH_4 , CO_2 and N_2O Emissions from a Short-Plant Ecosystem [J]. *Advances in Atmospheric Sciences*, 2003, 20(5): 842-844.
- [16] 刘芳, 刘丛强, 王仕禄, 等. 喀斯特地区土壤剖面 CO_2 、 CH_4 和 N_2O 浓度的相关关系 [J]. *生态学杂志*, 2010, 29(4): 717-723.
- [17] WANG Y Y, HU C S, MING H, et al. Methane, Carbon Dioxide and Nitrous Oxide Fluxes in Soil Profile under a Winter Wheat-Summer Maize Rotation in the North China Plain [J]. *PLoS One*, 2014, 9(6): e98445.
- [18] NISHIMURA S, KOMADA M, TAKEBE M, et al. Nitrous Oxide Evolved from Soil Covered with Plastic Mulch Film in Horticultural Field [J]. *Biology and Fertility of Soils*, 2012, 48(7): 787-795.
- [19] 李程, 李小平. 生物质炭制备及不同施用量对土壤碳库和植物生长的影响 [J]. *南方农业学报*, 2015, 46(10): 1786-1791.
- [20] SMITH J L, COLLINS H P, BAILEY V L. The Effect of Young Biochar on Soil Respiration [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2010, 42(12): 2345-2347.
- [21] DISSANAYAKE P D, CHOI S W, IGALAVITHANA A D, et al. Sustainable Gasification Biochar as a High Efficiency Adsorbent for CO_2 Capture: A Facile Method to Designer Biochar Fabrication [J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2020, 124: 109785.
- [22] 李鸿, 史东梅, 盘礼东. 生物炭与化肥配施对紫色土坡耕地侵蚀性耕层土壤水分及入渗特性的影响 [J]. *西南大学学报(自然科学版)*, 2024, 46(4): 121-132.
- [23] KUZYAKOV Y, BOGOMOLOVA I, GLASER B. Biochar Stability in Soil: Decomposition during Eight Years and Transformation as Assessed by Compound-Specific ^{14}C Analysis [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2014, 70: 229-236.
- [24] SNYDER C S, BRUULSEMA T W, JENSEN T L, et al. Review of Greenhouse Gas Emissions from Crop Production

- Systems and Fertilizer Management Effects [J]. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 2009, 133(3/4): 247-266.
- [25] 杨波, 陈照志, 周自强, 等. 大气 CO₂ 浓度和温度升高对稻麦轮作系统土壤剖面甲烷分布的影响 [J]. *中国科技论文*, 2014, 9(9): 985-990.
- [26] NAN W G, YUE S C, HUANG H Z, et al. Effects of Plastic Film Mulching on Soil Greenhouse Gases (CO₂, CH₄ and N₂O) Concentration within Soil Profiles in Maize Fields on the Loess Plateau, China [J]. *Journal of Integrative Agriculture*, 2016, 15(2): 451-464.
- [27] 刘凯明, 张海, 李霞, 等. 三江平原农田排水期流域水体 CH₄ 排放特征及影响因素 [J]. *中国环境科学*, 2024, 44(6): 3078-3090.
- [28] STANLEY E H, CASSON N J, CHRISTEL S T, et al. The Ecology of Methane in Streams and Rivers: Patterns, Controls, and Global Significance [J]. *Ecological Monographs*, 2016, 86(2): 146-171.
- [29] 胡晓康, 咎逢宇, 常素云, 等. 天津市海河温室气体排放特征与影响因素研究 [J]. *生态环境学报*, 2021, 30(4): 771-780.
- [30] 曾凤铃, 邹玉霞, 张卫华, 等. 生物炭用量与粒径对紫色土水分入渗及再分布特征的影响 [J]. *西南大学学报(自然科学版)*, 2022, 44(12): 136-144.
- [31] LIU Z X, CHEN X M, JING Y, et al. Effects of Biochar Amendment on Rapeseed and Sweet Potato Yields and Water Stable Aggregate in Upland Red Soil [J]. *Catena*, 2014, 123: 45-51.
- [32] ZHAO Q Z, WANG Y F, XU Z H, et al. How Does Biochar Amendment Affect Soil Methane Oxidation? A Review [J]. *Journal of Soils and Sediments*, 2021, 21(4): 1575-1586.
- [33] 贾俊香, 熊正琴. 典型菜地土壤剖面 N₂O、CH₄ 与 CO₂ 分布特征研究 [J]. *中国生态农业学报*, 2015, 23(12): 1536-1543.
- [34] LV J H, LI Q, ZHANG J B, et al. Nitrogen Addition Increases CO₂, CH₄ and N₂O Concentrations of Topsoils and Subsoils in a Subtropical Moso Bamboo Forest [J]. *Catena*, 2022, 216: 106397.
- [35] 杜康, 张北赢. 黄土丘陵区不同土地利用方式土壤水分变化特征 [J]. *水土保持研究*, 2020, 27(6): 72-76.
- [36] 王晓辉, 郭光霞, 郑瑞伦, 等. 生物炭对设施退化土壤氮相关功能微生物群落丰度的影响 [J]. *土壤学报*, 2013, 50(3): 624-631.
- [37] 马芸芸, 周伟, 何莉莉, 等. 秸秆生物质炭对稻田土壤剖面 N₂O 和 N₂浓度的影响 [J]. *土壤学报*, 2021, 58(6): 1540-1551.
- [38] CAYUELA M L, SÁNCHEZ-MONEDERO M A, ROIG A, et al. Biochar and Denitrification in Soils: When, how much and why Does Biochar Reduce N₂O Emissions? [J]. *Scientific Reports*, 2013, 3: 1732.

责任编辑 包颖